

URIVAC®
doplňk stravy
směs bakteriálních lyzátů

Jedna perorální kapsle obsahuje následující aktivní složky:

Lyofilizát bakteriálních lyzátů (celkem 5 mg):

Propionibacterium acnes (CCM 7083) 1,66 mg*
Klebsiella pneumoniae (CCM 7589) 0,67 mg*
Pseudomonas aeruginosa

(CCM 7590) 0,67 mg*
Enterococcus faecalis (CCM 7591) 0,67 mg*
Escherichia coli (CCM 7593) 0,67 mg*
Proteus mirabilis (CCM 7592) 0,67 mg*

*referenční hodnota příjmu není stanovena

Složení:

Bramborový škrob a laktóza (plnidla), želatina a čištěná voda (kapsle), uhlíkatý vápenatý a modifikovaný kukuřičný škrob (barvivo kapsle), lyofilizát bakteriálních lyzátů, oxid křemičitý (protispěšková látka).

Charakteristika:

URIVAC® je originální patentovaný přípravek vyráběný moderními biotechnologickými a purifikačními (čisticími) metodami pod farmaceutickým dohledem a kontrolou. Přípravek byl vyvinut ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Obsahuje unikátní kombinaci purifikovaných bakteriálních lyzátů (vysoce přečištěné neškodné části inaktivovaných mikroorganismů) z nejčastějších původců zánětů močových cest. Neobsahuje lepek.

Doporučené dávkování a způsob užívání:

Užívat 1 kapsli denně po dobu 10 dní, poté 20 dní vynechat a opět užívat 1 kapsli denně po dobu 10 dní, následně opět 20 dní vynechat a pak opět užívat 1 kapsli denně po dobu 10 dní.

Kapsle se užívá nejlépe ráno nalačno a zapije se vodou.

Po ukončení tohoto základního cyklu užívání přípravku URIVAC® je možno v tomto dávkování po opětovné 20denní přestávce pokračovat.

Nemáte-li ještě naplánovaný Váš dávkovací kalendář, pak pro správné užívání přípravku použijte „URIVAC® - Dávkovací kalendář“ na zadní straně tohoto informačního letáku.

Upozornění:

Určeno pro děti od 7 let, mladistvé a dospělé. Není určeno dětem do 3 let. Případné užívání dětmi ve věku 3 - 6 let, těhotnými a kojícími ženami je nutné předem konzultovat s lékařem. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Není určeno jako náhrada pestré stravy.

Bez předchozí konzultace s lékařem se nedoporučuje současné užívání s imunobiologickými přípravky nebo užívání osobami s autoimunitním onemocněním.

Nesmí se užívat při přecitlivělosti na některou z použitých složek. Přípravek obsahuje laktózu.

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Ukládejte mimo dosah dětí.

Uchovávání:

Skladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 °C.

Balení:
30 kapslí. Hmotnost obsahu 7,5 g.

Nakládání s obaly:

Vnější obal (krabičku) po upotřebení recyklujte a vnitřní obal (blister) vyhodte do směsného odpadu.

Číslo šarže:

Uvedeno na spodní straně krabičky a okraji blisteru.

Minimální trvanlivost:

Datum minimální trvanlivosti uvedeno na spodní straně krabičky a okraji blisteru.

Výrobce:

Bioveta, a. s.
Medical Department
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

Distributor v ČR:

S&D Pharma CZ, spol. s r. o.
Pisnická 22
142 00 Praha 4
Česká republika



URIVAC® - Dávkovací kalendář

Měsíc:	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
	1 kapsle denně po dobu 10 dní						
	20 dní vynechat						
Měsíc:	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
	1 kapsle denně po dobu 10 dní						
	20 dní vynechat						
Měsíc:	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
	1 kapsle denně po dobu 10 dní						