

CANDIVAC® doplňěk stravy směs kandidových lyzátů

Jedna perorální kapsle obsahuje následující aktivní složky:

Lyofilizát mikrobiálních lyzátů (celkem 5 mg):

<i>Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum</i> (CCM 7083)	2,50 mg*
<i>Candida albicans lysatum cryodessicatum</i> (CCM 8355)	0,83 mg*
<i>Candida krusei lysatum cryodessicatum</i> (CCM 8357)	0,83 mg*
<i>Candida glabrata lysatum cryodessicatum</i> (CCM 8356)	0,83 mg*

* referenční hodnota příjmu není stanovena

Složení:

Plnidla: bramborový škrob, laktóza; kapsle: želatina, čištěná voda, uhlíčená vápenatá, modifikovaný kukuřičný škrob; lyofilizát mikrobiálních lyzátů; protispěková látka: oxid křemičitý.

Charakteristika:

CANDIVAC® je originální patentovaný přípravek vyráběný moderními biotechnologickými a purifikačními (čisticími) technologiemi pod farmaceutickým dohledem a kontrolou. Přípravek byl vyvinut ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Obsahuje unikátní kombinaci purifikovaných kandidových lyzátů (vysoce přečištěné neškodné části inaktivovaných mikroorganismů) z nejčastějších původců vaginálních a ústních kandidóz. Přípravek mohou užívat ženy i muži. Neobsahuje lepek.

Doporučené dávkování a způsob užívání:

Užívat 1 kapsli denně po dobu 10 dní, poté 20 dní vynechat a opět užívat 1 kapsli denně po dobu 10 dní, následně opět 20 dní vynechat a pak opět užívat 1 kapsli denně po dobu 10 dní. Kapsle se užívá nejlépe ráno nalačno a zapijí se vodou.

Po ukončení tohoto základního cyklu užívání přípravku CANDIVAC® je možno v tomto dávkování po opětovně 20denní přestávce pokračovat.

Nemáte-li ještě naplánovaný Váš dávkovací kalendář, pak pro správné užívání přípravku použijte „CANDIVAC® - Dávkovací kalendář“ na

zadní straně tohoto informačního letáku.

Upozornění:

Určeno pro děti od 7 let, mladistvé a dospělé. Není určeno dětem do 3 let. Případné užívání dětmi ve věku 3 - 6 let, těhotnými a kojícími ženami je nutné předem konzultovat s lékařem. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Není určeno jako náhrada pestré stravy. Bez předchozí konzultace s lékařem se nedoporučuje současné užívání s imunobiologickými přípravky nebo užívání osobami s autoimunitním onemocněním. Nesmí se užívat při přecitlivělosti na některou z použitých složek. Přípravek obsahuje laktózu. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Ukládejte mimo dosah dětí.

Uchovávání:

Skládejte v suchu a temnu při teplotě do 25 °C.

Balení:

30 kapslí. Hmotnost obsahu 7,6 g.

Nakládání s obaly:

Vnější obal (krabičku) po upotřebení recyklujte a vnitřní obal (blistr) vyhoďte do směsného odpadu.

Číslo šarže:

Uvedeno na spodní straně krabičky a okraji blistru.

Minimální trvanlivost:

Datum minimální trvanlivosti uvedeno na spodní straně krabičky a okraji blistru.

Výrobce:

Bioveta, a. s.
Medical Department
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

Distributor v ČR:

S&D Pharma CZ, spol. s r. o.
Pisnická 22
142 00 Praha 4
Česká republika

bioveta



CANDIVAC® – Dávkovací kalendář

1 kapsle denně po dobu 10 dní	Měsíc:	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30	31					
	20 dní vynechat							
	Měsíc:							
1 kapsle denně po dobu 10 dní	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30	31					
	20 dní vynechat							
	Měsíc:							
1 kapsle denně po dobu 10 dní	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30	31					
	20 dní vynechat							
	Měsíc:							