bioveta

WE respect ANIMALS

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

Ветеринарные препараты для репродукции КРС и схемы их применения

Гормональные и другие ветеринарные препараты производства АО "Биовета", применяемые в процессе репродукции КРС*

ЭСТРОФАН

инъекционный гормональный препарат с лютеолитическим эффектом

Содержит в 1 мл: 250 мкг синтетического аналога простагландина *PGF2a* (клопростенол).

Показания к применению: для лечения и регуляции репродуктивных функций у самок сельскохозяйственных животных.

ВИТА Е СЕЛЕН

инъекционный раствор витамина Е и селена

Содержит в 1 мл: альфа-токоферол ацетат – 25 мг, селенит натрия – 2,2 мг (что равносильно 1 мг селена)

Показания к применению: препарат предназначен для профилактики и лечения заболеваний, вызванных дефицитом витамина Е и селена, в частности мышечная дистрофия у молодого домашнего скота.
Имеет также положительное влияние на репродуктивные функции.

МУЛЬТИВИТ-МИНЕРАЛ

инъекционный раствор витаминов, аминокислот и элементов

Содержит в 1 мл: ретинол – 50 000 МЕ, холекальциферол – 25 000 МЕ, витамин Е – 4 мг, тиамин – 10 мг,рибофлавин – 0,04 мг, пиридоксин – 2 мг, цианокобаламин – 0,01 мг, декспантенол – 2 мг, никотиновая кислота – 5 мг, инозитол – 2 мг, рацемический метионин – 5 мг, лимонный холин – 5 мг, гексагидрит гипофосфатаза магнезии – 1 мг, хлорид кобальта – 0,02 мг, сульфат меди – 0,1 мг, сульфат цинка – 0,1 мг

Показания к применению: проблемы с ростом и метаболизмом у молодых домашних животных, повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям, усиление неспецифической защиты организма и положительное влияние на рост и репродуктивные функции.
Доза внутримышечно: КРС 2–6 мл / 100 кг массы тела.

ЙОДОУТЕР 100мг/м. раствор

внутриматочный антисептик на основе связанного йода с вспомогательными веществами

Содержит в 1 мл: povidonum iodinatum 100 мг (10%)

Показания к применению: локальный антисептик на основе йода, который применяется внутриматочно и вагинально для лечения вагинитов, эндометритов, задержании последа и после оперативного внутриматочного вмешательства. Имеет щадящее действие на слизистую миометрия. Особый эффект имеет при лечении хронических форм эндометритов, способствуя ускорению процесса выздоровления и сокращения сервис-периода.

СЕРГОН

сывороточный гонадотропин жеребых кобыл в виде инъекций

Содержит в 1 мл: Сывороточный гонадотропин жеребых кобыл – 500 МЕ.

Показания к применению: для стимуляции половой охоты и полиовуляции у самок сельскохозяйственных животных.

ЛЕЦИРЕЛИН Биовета 0,025 мг/мл

синтетический супераналог гонадотропин-рилизинг-гормона (GhRH) в виде раствора для инъекций

Содержит в 1 мл: 0,025 мг лецирелина.

Показания к применению: для синхронизации течки; регулирует срок овуляции, улучшает показатели беременности после оплодотворения и имеет позитивный эффект в лечении ациклии и кист яичников.

АДЕ-Вит

инъекционный раствор витаминов

Содержит в 1 мл: 1 мл раствора для инъекции содержит: ретинол пропионат – 100 000 МЕ, эргокальциферол – 100 000 МЕ, токоферол альфа ацетат – 30 мг

Показания к применению: Гиповитаминоз и авитаминоз витаминами А, D2 и Е, проблемы с ростом и метаболизмом у молодых домашних животных, повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям дыхательной системы и системы пищеварения; гемералопия, ксерофтальмия, кератомаляция, энзема, рахит, остеомаляция, расстройство, вызванное пониженным уровнем кальция в организме, поддержание строения костей, дерматит. Поддерживающее лечение бесплодия без уточнения этиологии, профилактика заболеваний эмбриональной смертности и образования зародыша в период беременности, олигоспермия, проблемы с либидо у животных, миодистрофия у ягнят и телят; пополнение резервов витаминов и минералов до родов и у новорожденных животных, в частности в незащищенных зоогигиенических условиях и при диетах.

Окситоцин БИО

окситоцин в виде раствора для инъекций

Содержит в 1 мл: окситоцин 5,0 МЕ

Показания к применению: для поддержания родов при первичном или вторичном ослаблении сокращений и для ускорения второй стадии родов; для стимулирования инволюции в случае удерживания плаценты и экзометры, для удаления патологического содержимого матки, эндометрита, пиометры.
Агалактия в результате нарушения секреции молока после родов у всех целевых видов. Для удаления остаточного количества молока или токсичного материала из вымени после родов и при лечении инфекционных маститов у коров.

Профилактика и лечение задержания последа



ЙОДОУТЕР

Состав: Povidonum iodinatum, вспомогательные вещества (Dexpanthenol, Glycerol 85%, Nonoxinol 9, Poloxamer 188, Acidum citricum monohydricum, Natrii hydrogenophosphas dodecahydrate, aqua pro injectione).

Показания к применению: применяют для лечения хронических эндометритов или при продолжении лечения задержания последа (после 15 дня после отёла).

Перед использованием **Йодоутера** необходима стимуляция сокращения и очищения матки от патологического материала.

Для этого рекомендуем 1 – 3 инъекции препарата „**Эстрофан**" 2 – 3 мл внутримышечно (в зависимости от количества патологического материала и размера матки).

Рекомендуемая схема профилактики и лечения задержания последа

- за 30 и за 14 дней перед отелом: препарат "**Вита Е Селен**" (по 20 мл);
- на 1-й и 3-й дни после отела: **Окситоцин БИО** (по 50 МЕ);
- на 2-й, 4-й, 5-й, 12-й и 15-й дни после отела: препарат "**Эстрофан**" (по 3 мл).
- после препарат "**Йодоутер**" (50-150 мл)

** Предложенные в указанном каталоге схемы лечения и использования ветеринарных препаратов носят исключительно рекомендательный характер и могут быть скорректированы на усмотрение и по показаниям ветеринарного врача*

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ - период после отела



СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ

Применяют в целях улучшения результатов искусственного осеменения (ИО), чтобы продолжительность „индепенденс-периода" (периода от отёла до 1-го ИО) была около 65 – 70 дней, а продолжительность „сервис-периода" (периода от отёла до стельности) была 100 -120 дней. Оптимальное число ИО на одну стельность в среднем 1,8 – 2, максимум 2 ИО на одну стельность.

АДЕ – Вит

Для поддерживающего лечения бесплодия КРС в комбинации с другими препаратами.
Применяют через 40 - 45 дней после отёла, 10 мл внутримышечно.

МУЛТИВИТ МИНЕРАЛ

Для поддерживающего лечения бесплодия КРС в комбинации с другими препаратами.
Применяют через 40 - 45 дней после отела, 6 мл внутримышечно.

ЭСТРОФАН

Применение (лекарство вводят внутримышечно):

1) для стимуляции отёла: после 285-го дня стельности, чтобы телёнок не был очень большой или у больных коров (после 270-го дня стельности), чтобы сохранить телёнка, когда корова пойдёт на убой;
2) для стимуляции сокращения матки при задержании последа;
3) для стимуляции сокращения матки и очищения
4) для синхронизации полового цикла (по схеме Ovsynch).

** Предложенные в указанном каталоге схемы лечения и использования ветеринарных препаратов носят исключительно рекомендательный характер и могут быть скорректированы на усмотрение и по показаниям ветеринарного врача*

OVSYNCH – схема синхронизации полового цикла у коров и телок** (→ синхронизация охоты + искусственного осеменения)



OVSYNCH – схема синхронизации полового цикла у коров (охоты + искусственного осеменения)

0-ой день (Пн, 8:00) → GnRH (препарат „**Лецирелин**") 4 мл внутримышечно;
7-ой день (Пн, 8:00) → PG F2 (препарат „**Эстрофан**") 2 мл внутримышечно;
8-ой день (Вт, 8:00) → PG F2 (препарат „**Эстрофан**") 2 мл внутримышечно;
9-ый день (Ср, 16:00) → GnRH (препарат „**Лецирелин**") 2 мл внутримышечно (56 часов после первого применения препарата „**Эстрофан**"!!!)
10-ый день (Чт, 8:00) → искусственное осеменение => ИО через 16 часов после введения препарата „**Лецирелин**" => ОВУЛЯЦИЮ ЖДЁМ В ЧЕТВЕРГ В 16:00 ч.

Необходимо точно соблюдать точное время инъекций.

**** Указанную схему можно использовать для телок возраста 14 месяцев или весом более 350 кг, у которых охота еще не наблюдалась.**

** Предложенные в указанном каталоге схемы лечения и использования ветеринарных препаратов носят исключительно рекомендательный характер и могут быть скорректированы на усмотрение и по показаниям ветеринарного врача*

Продолжение схемы OVSYNCH – контроль стельности

У нестельных коров после искусственного осеменения и после УЗИ-контроля начинаем снова схему OVSYNCH (т.н. RESYNCH)



Рекомендуемый вариант продолжения схемы OVSYNCH после искусственного осеменения:

18-й – 23-й день после ИО – контроль появления охоты (если нет охоты, корова может быть стельная!!!)

34-38-ой день (более 28 дней после ИО) ⟶ УЗИ-контроль для определения стельности ⟶ у стельных - контроль стельности на 75-й – 90-й день стельности

У нестельных ⟶ снова начинаем схему OVSYNCH (через неделю,перед инъекцией препарата „**Эстрофан**", УЗИ-контроль для определения возможной стельности)

** Предложенные в указанном каталоге схемы лечения и использования ветеринарных препаратов носят исключительно рекомендательный характер и могут быть скорректированы на усмотрение и по показаниям ветеринарного врача*

Лечение гипофункции яичников (анэструс)



Рекомендуемая схема лечения гипофункции яичников

- через 40-45 дней после отела: препарат "**АДЕ-Вит**" (10 мл);
- через 40-45 дней после отела: препарат "**МУЛЬТИВИТ-МИНЕРАЛ**" (6 мл);
- на 55-ый - 60-ый день после отела: УЗИ-контроль половых органов на предмет отсутствия фолликулов или желтого тела;
- на 55-ый - 60-ый день после отела (после УЗИ-контроля): препарат "**АДЕ-Вит**" (10 мл);
- на 55-ый - 60-ый день после отела (после УЗИ-контроля): препарат "**МУЛЬТИВИТ-МИНЕРАЛ**" (6 мл);
- на 55-ый - 60-ый день после отела (после УЗИ-контроля): препарат "**Сергон**" (1000 - 1500 МЕ).

Охоту ждем через 3-5 дней после инъекции.

** Предложенные в указанном каталоге схемы лечения и использования ветеринарных препаратов носят исключительно рекомендательный характер и могут быть скорректированы на усмотрение и по показаниям ветеринарного врача*

Лечение кист**



Рекомендуемая схема лечения кист

- через 40-45 дней после отела: препарат "**АДЕ-Вит**" (10 мл);
- через 40-45 дней после отела: препарат "**МУЛЬТИВИТ МИНЕРАЛ**" (6 мл);
- через 55-60 дней после отела: УЗИ-контроль на предмет наличия на яичниках фолликулярных кист;
- Рекомендуем 3 дня инъекции GnRH (каждый день препарат „**Лецирелин**" 4 мл внутримышечно);
- Через 10 дней после 1-ой инъекции GnRH – 2 мл препарата „**Эстрофан**" внутримышечно;
- Через одну неделю после препарата „**Эстрофан**" (если нет кист - около 50% коров) начинаем схему синхронизации полового цикла OVSYNCH.

** Предложенные в указанном каталоге схемы лечения и использования ветеринарных препаратов носят исключительно рекомендательный характер и могут быть скорректированы на усмотрение и по показаниям ветеринарного врача*

*** Тройное применение препарата "Лецирелин" с суточными интервалами рекомендуем на основании современных практических опытов с максимальным эффектом лечения.*

Для заметок

Для заметок



bioveta

WE respect ANIMALS

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

По всем интересующим вопросам обращайтесь, пожалуйста, к:

Производитель
Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Czech Republic
European Union

Йозеф Зайиц
Доктор ветеринарной медицины
Кандидат наук
Консультант- специалист АО "Биовета"
e-mail: zajic.josef@bioveta.cz

Павел Рашка
Доктор ветеринарной медицины
Консультант- специалист АО "Биовета"
e-mail: raska.pavel@bioveta.cz