ВАКЦИНЫ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

ЖИВЫЕ ОСЛАБЛЕННЫЕ ВАКЦИНЫ

ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ

bioveta

WE respect ANIMALS

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

ОРНИБРОН H120

Вакцина против инфекционного бронхита кур живая лиофилизированная

Состав: *Virus bronchitidis infectiosae avium*,
штамм H120 мин. $10^{3,0}$ $ЭИД_{50}$, макс. $10^{5,3}$ $ЭИД_{50}$

Целевые животные: Бройлеры, куры-несушки коммерческого стада, племенные бройлеры и птицы родительского стада.

Показания: Активная иммунизация домашней птицы против инфекционного бронхита, вызываемого штаммом Massachusetts.

Дозировка и способ применения: Вакцину применяют интраокулярно, интраназально, перорально (методом выпаивания с питьевой водой), методом опрыскивания (спрей-метод) в разбавленном виде. Вакцинируют цыплят в суточном возрасте. Повторная вакцинация проводится через 4 недели после первичной вакцинации, а затем дополнительная доза вакцины вводится в возрасте птицы от 12 до 14 недель.

Срок годности: 30 месяцев.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений

Форма выпуска: 200, 500, 2500 и 5000 доз.

ОРНИБРОН H120 + D274

Вакцина против инфекционного бронхита кур живая лиофилизированная

Состав: *Virus bronchitidis infectiosae avium*,
(штамм H-120) мин. $10^{3,0}$ $ЭИД_{50}$ - макс. $10^{4,8}$ $ЭИД_{50}$*
Virus bronchitidis infectiosae avium,
(штамм D-274) мин. 103,0 ЭИД50 - макс. 104,8 ЭИД50*

Целевые животные: Бройлеры, куры-несушки коммерческого стада, племенные бройлеры и птицы родительского стада.

Показания: Активная иммунизация домашней птицы против инфекционного бронхита, вызываемого штаммами Massachusetts и вариантным штаммом D-274.

Дозировка и способ применения: Вакцинируют цыплят в суточном возрасте. Повторная вакцинация проводится через 28-35 дней после первичной вакцинации, а затем дополнительная доза вакцины вводится в возрасте птицы от 10 до 12 недель. Вакцину применяют интраокулярно, интраназально, перорально (методом выпаивания с питьевой водой), методом опрыскивания (спрей-метод) в разбавленном виде. Рабочую суспензию готовят непосредственно перед вакцинацией.

Срок годности: 30 месяцев.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений.

Форма выпуска: 200, 500, 2500 и 5000 доз.

ЖИВЫЕ ОСЛАБЛЕННЫЕ ВАКЦИНЫ

ОРНИПРИМ КЛОН B1

Вакцина против болезни Ньюкасла живая лиофилизированная

Состав: *Paramyxovirus pseudopestis avium*, (штамм Hitchener (B1) Bio 52: NDV B1) мин. $10^{6,0}$ $ЭИД_{50}$,макс. $10^{7,5}$ $ЭИД_{50}$

Целевые животные: Бройлеры, куры-несушки коммерческого стада, племенные бройлеры и птицы родительского стада.

Показания: Активная иммунизация домашней птицы против болезни Ньюкасла.

Дозировка и способ применения: Вакцину применяют интраокулярно, интраназально, перорально (методом выпаивания с питьевой водой), методом опрыскивания (спрей-метод) в разбавленном виде. Вакцинируют цыплят в суточном возрасте. Повторная вакцинация проводится через 4 недели после первичной вакцинации, а затем дополнительная доза вакцины вводится в возрасте птицы от 12 до 14 недель.

Срок годности: 30 месяцев.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений.

Форма выпуска: 200, 500, 2500 и 5000 доз.

ОРНИПЕСТ

Вакцина против болезни Ньюкасла живая лиофилизированная

Состав: *Paramyxovirus pseudopestis avium*, (штамм Lasota, Bio 52: NDV B1) мин. $10^{6,0}$ $ЭИД_{50}$ - макс. $10^{8,0}$ $ЭИД_{50}$

Целевые животные: Бройлеры, куры-несушки коммерческого стада, племенные бройлеры и птицы родительского стада.

Показания: Активная иммунизация домашней птицы против болезни Ньюкасла.

Дозировка и способ применения: Вакцину применяют интраокулярно, интраназально, перорально (методом выпаивания с питьевой водой), методом опрыскивания (спрей-метод) в разбавленном виде. Рабочую суспензию готовят непосредственно перед вакцинацией.
Вакцинируют цыплят начиная с 2-х недельного возраста. Используют либо в качестве первичной вакцинации, либо в качестве ревакцинации для цыплят, привитых вакциной Орниприм в суточном возрасте.

Срок годности: 30 месяцев.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений

Форма выпуска: 200, 500, 2500 и 5000 доз.

ОРНИМИКС КЛОН B1+H120

Вакцина против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита кур живая лиофилизированная

Состав: Paramyxovirus pseudopestis avium, (штамм Bio 52: NDV B1) мин. $10^{6,0}$ ЭИД$_{50}$ - макс. $10^{7,5}$ ЭИД$_{50}$
Virus bronchitidis infectiosae avium, (штамм Bio 53: IBV H120) мин. $10^{3,0}$ ЭИД$_{50}$ - макс. $10^{4,8}$ ЭИД$_{50}$

Целевые животные: Бройлеры, куры-несушки коммерческого стада, племенные бройлеры и птицы родительского стада.

Показания: Активная иммунизация домашней птицы против инфекционного бронхита кур и болезни Ньюкасла.

Дозировка и способ применения: Вакцину применяют интраокулярно, интраназально, перорально (методом выпаивания с питьевой водой), методом опрыскивания (спрей-метод) в разбавленном виде. Вакцинируют цыплят начиная с суточного возраста. Ревакцинация через 4 недели с питьевой водой вакцинированных цыплят и через 6 недель спрей-методом или интраназально/интраокулярно .

Срок годности: 24 месяца.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений.

Форма выпуска: 200, 500, 2500 и 5000 доз.

ОРНИБУР ИНТЕРМЕДИАТ

Вакцина против болезни Гамборо живая лиофилизированная

Состав: *Virus bursitidis infectiosae avium*, (штамм IBDV OP-23) мин. $10^{4,0}$ ЦПД$_{50}$, макс. $10^{5,3}$ ЦПД$_{50}$

Целевые животные: Бройлеры, куры-несушки коммерческого стада, племенные бройлеры и птицы родительского стада.

Показания: Активная иммунизация домашней птицы против инфекционной бурсальной болезни (IBD).

Дозировка и способ применения: Первая вакцинация цыплят, полученных от кур, вакцинированных инактивированной вакциной, производится в возрасте от 21 до 28 дней. Вакцину применяют интраокулярно, интраназально, перорально (методом выпаивания с питьевой водой) в разбавленном виде. Рабочую суспензию готовят непосредственно перед вакцинацией. В хозяйствах с неблагополучной эпизоотической ситуацией по болезни Гамборо профилактическая вакцинация должна проводиться через 1 неделю (рекомендуется по результатам серологических исследований)

Срок годности: 24 месяца.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений.

Форма выпуска: 200, 500, 2500 и 5000 доз.

ЖИВЫЕ ОСЛАБЛЕННЫЕ ВАКЦИНЫ

ОРНИБУР ИНТЕРМЕДИАТ ПЛЮС

вакцина против болезни Гамборо живая лиофилизированная

Состав: Virus bursitidis infectiosae avium (штамм IBDV OP-1) мин. $10^{4,0}$ ЦПД$_{50}$ – макс. $10^{5,2}$ ЦПД$_{50}$

Целевые животные: Бройлеры, куры-несушки коммерческого стада, племенные бройлеры и птицы родительского стада.

Показания: Активная иммунизация домашней птицы против инфекционной бурсальной болезни (болезни Гамборо) на фермах, где наличие антител материнского происхождения (MDA) приводит к нейтрализации вакцины.

Дозировка и способ применения: Первая вакцинация цыплят, полученных от кур, вакцинированных живой вакциной, производится в возрасте от 7 до 14 дней.
Первая вакцинация цыплят, полученных от кур, вакцинированных инактивированной вакциной, производится в возрасте от 14 до 21 дня. Вакцину применяют интраокулярно, интраназально, перорально (методом выпаивания с питьевой водой) в разбавленном виде. Рабочую суспензию готовят непосредственно перед вакцинацией. Профилактическая вакцинация должна проводиться один раз в возрасте 21 дня.

Срок годности: 30 месяцев.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений.

Форма выпуска: 200, 500, 2500 и 5000 доз.

САЛГЕН

Вакцина против птичьего сальмонеллеза живая лиофилизированная

Состав: *Salmonella typhimurium attenuata* мин. 2×10^{6}, макс. $3{,}8\times10^{7}$

Целевые виды животных: Домашняя птица, гуси, утки, индейки, фазаны и голуби.

Показания: активная иммунизация целевых видов животных против сальмонеллы серотипов группы B и D для уменьшения выделения S. typhimurium с фекалиями и колонизации внутренних органов бактериями.

Дозировка и способ применения: Первичная вакцинация в течение первой недели жизни с последующей ревакцинацией через 1 неделю. Вакцину применяют разбавленной перорально: методом выпаивания с питьевой водой или индивидуально вводят в дозе 0,2 мл на одну птицу.

Срок годности: 24 месяца.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 14 дней для яиц и продуктов убоя.

Форма выпуска: 20 мл (50 доз) и 50 мл (500 доз).

IN PIPE-LINE

ОРНИПОКС

Вакцина против оспы птиц живая лиофилизированная

Состав: *Virus variolae gallinaceae*, (штамм 92) мин. $10^{2,7}$ ЭИД$_{50}$, макс. $10^{4,5}$ ЭИД$_{50}$

Целевые животные: Домашняя птица

Показания: Активная иммунизация домашней птицы против оспы птиц.

Дозировка и способ применения: вакцина применяется в разбавленном виде, в дозе 0,01 мл путем введения в перепонку крыла.

Первичная вакцинация в возрасте 6-14 недель, при более поздней вакцинации - за 4 недели до начала яйцекладки.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Форма выпуска: 1000 доз.

IN PIPE-LINE

ОРНИ АЕ

Вакцина против инфекционного энцефаломиелита живая

Состав: *Virus encephalomyelitis avium*, (штамм Calnek 1143), мин. $10^{3,0}$ EID$_{50}$, макс. $10^{5,3}$ ЭИД$_{50}$

Целевые животные: Куры-несушки коммерческого стада, племенные бройлеры.

Показания: Активная иммунизация целевых животных против инфекционного энцефаломиелита.

Дозировка и способ применения: вакцина применяется перорально с питьевой водой или путем введения в перепонку крыла.

Первичная вакцинация в возрасте 8-17 недель, при более поздней вакцинации - за 4 недели до начала яйцекладки.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: Не применять позднее, чем за 4 недели до начала яйцекладки и в течение периода яйцекладки.

Форма выпуска: 1000 доз.

ЖИВЫЕ ОСЛАБЛЕННЫЕ ВАКЦИНЫ

IN PIPE-LINE

ОРНИПОКС АЕ

Вакцина против оспы птиц и инфекционного энцефаломиелита живая лиофилизированная

Состав: *Virus encephalomyelitis avium*, (штамм Calnek1143), мин. $10^{3,0}$ ЭИД$_{50}$, макс. $10^{5,3}$ ЭИД$_{50}$

Poxvirus, (штамм FP 92), мин. $10^{2,7}$, макс. $10^{4,5}$

Целевые животные: Куры-несушки коммерческого стада, племенные бройлеры.

Показания: Активная иммунизация целевых животных против оспы птиц и инфекционного энцефаломиелита.

Дозировка и способ применения: вакцина применяется в разбавленном виде, в дозе 0,01 мл путем введения в перепонку крыла.

Первичная вакцинация в возрасте 8-17 недель, при более поздней вакцинации - за 4 недели до начала яйцекладки.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: Не применять позднее, чем за 4 недели до начала яйцекладки.

Форма выпуска: 1000 доз.

ОРНИВАК ND

Вакцина против болезни Ньюкасла инактивированная эмульгированная

Состав: *Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum*, (штамм NDV SL-93) > 4 log2 HIT

Целевые животные: Домашняя птица

Показания: Активная иммунизация молодняка и кур, привитых первоначально живой ослабленной вакциной против болезни Ньюкасла в период выращивания.

Дозировка и способ применения: вакцина вводится в дозе 0,3 мл, внутримышечно в грудную мышцу.

Вакцинацию можно проводить с 16-недельного возраста, предпочтительно за 2-4 недели до начала яйцекладки.

Срок годности: 18 месяцев.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений.

Форма выпуска: 240 мл (800 доз) и 480 мл (1600 доз).

ОРНИВАК ND (СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА)

Вакцина против болезни Ньюкасла инактивированная эмульгированная

Состав: Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum,(штамм NDV SL-93) > 4 log2 HIT

Целевые животные: Домашняя птица

Показания: Активная иммунизация суточных цыплят в инкубаториях на ферме после прибытия.

Дозировка и способ применения: вакцина может применяться у суточных цыплят в дозе 0,1 мл. Для птицы с 16-недельного возраста доза составляет 0,3 мл. Вакцина вводится внутримышечно в грудную мышцу или подкожно, верхней дорсальной трети шеи.

Вакцинацию предпочтительно проводить за 4 недели до начала яйцекладки.

Срок годности: 18 месяцев.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений

Форма выпуска: 250 мл и 500 мл.

ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ

ОРНИВАК EDS

Вакцина против синдрома снижения яйценоскости эмульгированная

Состав: *Adenovirus inactivatum*, (штамм EDS 76) мин. 1000 HAU

Целевые животные: Племенные бройлеры, куры-несушки.

Показания: Активная иммунизация племенных бройлеров и кур-несушек против синдрома снижения яйценоскости.

Дозировка и способ применения: вакцина вводится в дозе 0,3 мл подкожно в дорсальную верхнюю треть шеи или внутримышечно в грудную мышцу.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений.

Форма выпуска: 240 мл (800 доз) и 480 мл (1600 доз).

ОРНИВАК ND+GO

Вакцина против болезни Ньюкасла и болезни Гамборо инактивированная эмульгированная

Состав: *Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum*, (штамм NDV SL-93) мин. 10^8 $ЭИД_{50}$
Virus bursitidis infectionsae avium ante inactivatum, (штамм OP-23) мин. $10^{6,6}$ $ЦПД_{50}$

Целевые животные: Племенные бройлеры, куры-несушки

Показания: Активная иммунизация племенных бройлеров и кур-несушек против болезни Ньюкасла и инфекционной бурсальной болезни (болезни Гамборо)

Дозировка и способ применения: вакцина вводится в дозе 0,5 мл подкожно в дорсальную верхнюю треть шеи или внутримышечно в грудную мышцу.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений

Форма выпуска: 250 мл (500 доз) и 500 мл (1000 доз).

ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ

ОРНИВАК ND + IB2 + EDS

Вакцина против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур и синдрома снижения яйценоскости инактивированная эмульгированная

Состав: *Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum,* (штамм NDV SL-93) мин. 4 log_2 HIT
Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum, (штамм IBV M-41) мин. 6,2 log_2 HIT*
Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum, (штамм IBV D 274) мин. 6,3 log_2 HIT*
Adenovirus inactivatum, (штамм EDS 76) мин. 6,5 log2 HIT

Целевые животные: Домашняя птица (молодняк и куры-несушки).

Показания: Активная иммунизация молодняка/будущих несушек против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита и вируса синдрома снижения яйценоскости.

Дозировка и способ применения: вакцина вводится в дозе 0,5 мл внутримышечно в грудную мышцу за 2-4 недели до начала яйцекладки.
Вакцинацию проводят молодняку/несушкам, привитым первоначально живой вакциной в период выращивания.

Срок годности: 18 месяцев.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений

Форма выпуска: 250 мл (500 доз), 500 мл (1000 доз).

ОРНИВАК ND+IB2+GO+EDS

Вакцина против болезни Ньюкасла, болезни Гамборо, инфекционного бронхита кур и синдрома снижения яйценоскости инактивированная эмульгированная

Состав: *Paramyxovirus pseudopestis avium, inactivatum,* (штамм NDV SL-93) мин. 4 log_2 HIT, *Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum,* (штамм IBV M-41) мин. 6,2 log_2 HIT, *Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum,* (штамм IBV D 274) мин. 6,3 log_2 HIT, *Virus bursitidis infectiosae avium ante inactivatum,* (штамм OP-23) мин. $10^{6,6}$ ЦПД$_{50}$, *Adenovirus inactivatum*, (штамм EDS 76) мин. 6,5 log_2 HIT

Целевые животные: Племенные бройлеры, куры-несушки

Показания: Активная иммунизация племенных бройлеров и кур-несушек против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита (2 штамма), инфекционной бурсальной болезни (болезнь Гамборо) и синдрома снижения яйценоскости.

Дозировка и способ применения: вакцина вводится в дозе 0,5 мл подкожно в дорсальную верхнюю треть шеи иливнутримышечно в грудную мышцу.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений

Форма выпуска: 250 мл (500 доз) и 500 мл (1000 доз).

ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ

ОРНИДАК

Вакцина против вирусного гепатита уток инактивированная эмульгированная

Состав: *Virus hepatitidis infectiosae anatum inactivatum* мин. $10^{5,0}$ KELD$_{50}$

Целевые животные: Утки

Показания: Активная иммунизация будущих уток-несушек против вирусного гепатита уток для переноса защитных иммуноглобулинов к их потомству/утят через яйца с эмбрионами.

Дозировка и способ применения: вакцина вводится в дозе 0,5 мл внутримышечно в грудную мышцу.
Первичная вакцинация за 6 недель до начала яйцекладки с последующей ревакцинацией через 3-4 недели.

Срок годности: 12 месяцев.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений

Форма выпуска: 250 мл (500 доз), 500 мл (1000 доз).

PMV-Salmo-Vac

Вакцина против парамиксовируса и сальмонеллеза инактивированная эмульгированная

Состав: *Paramyxovirus pseudopestis avium,* (штамм NDV SL-93), *inactivatum* RP > 1*
Salmonella typhimurium subsp. Copenhagen,(штамм 1, 4, 12 : 1, 2), *inactivatum* RP > 1*

Целевые виды животных: Голуби.

Показания: Активная иммунизация голубей с 3-недельного возраста против парамиксовируса и сальмонеллеза, вызванных S. typhimurium вар. Copenhagen

Дозировка и способ применения: вакцину вводят в дозе 0,3 мл подкожно в дорсальную верхнюю треть шеи.
Первичная вакцинация в возрасте 3–4 недель.
Ревакцинация через 4 недели после первичной вакцинации.
Взрослых голубей вакцинируют за 3 недели до наступления лета или за 3 недели до выставки.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: 0 дней. Продукты убоя и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений

Форма выпуска: 10, 20, 50 мл содержащие 25, 60 и 150 доз.

IN PIPE-LINE

ОРНИВАК FC

Вакцина против пастереллеза (холеры) птиц инактивированная эмульгированная

Состав: *Pasteurella multocida*, инактивированная,

– серовар 1 (≥ 5×10^8 КОЕ *)	RP ≥ 1**
– серовар 3 (≥ 5×10^8 КОЕ *)	RP ≥ 1**
– серовар 4 (≥ 5×10^8 КОЕ *)	RP ≥ 1**
– серовар 3×4 (≥ 5×10^8 КОЕ *)	RP ≥ 1**

Целевые виды: куры и индейки.

Показания: Для активной иммунизации целевых видов против холеры птиц, вызываемой бактерией Pasteurella multocida, серотипы 1, 3, 4, 3x4.

Дозировка и способ применения: вакцина вводится в дозе 0,5 мл подкожно в дорсальную верхнюю треть шеи или внутримышечно в грудную мышцу.

Цыплята: Первичная вакцинация — в возрасте 10-12-недель с последующей ревакцинацией через 4-6 недель.

В зависимости от эпизоотической ситуации можно проводить вакцинацию у 6-8-недельных цыплят. Первичная вакцинация в течение первой недели жизни и ревакцинация через 1 неделю.

Индюшки: Первичная вакцинация — в возрасте 18 недель с последующим введением 2-ой дозы вакцины через 4-6 недель. Исходя из текущей эпизоотической ситуации (например, если заболевание возникает в раннем возрасте), введение первой дозы возможно в возрасте 6-8 недель и ревакцинацию - через 4-6 недель после первой дозы.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: Не применять за 3 недели до убоя и за 4 недели до начала периода яйцекладки.

Форма выпуска: 500 мл (1000 доз).

ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ

IN PIPE-LINE

ОРНИВАК Coryza

Вакцина против гемофилеза инактивированная эмульгированная

Инактивированный бактерин *Avibacterium paragallinarum*

– серотип A (≥1x10^8 КОЕ*)	RP ≥ 1**
– серотип B (≥1x10^8 КОЕ*)	RP ≥ 1**
– серотип C (≥1x10^8 КОЕ*)	RP ≥ 1**

Целевые виды: Домашняя птица

Показания: Для активной иммунизации цыплят и несушек против инфекционного ринита, вызванного. Avibacterium paragallinarum, серотипы A, B и C.

Дозировка и способ применения: вакцина вводится в дозе 0,5 мл подкожно в дорсальную верхнюю треть шеи или внутримышечно в грудную мышцу.

Первую дозу вакцины вводят не ранее 5-недельного возраста, вторую дозу вводят не ранее чем через 4 недели после первой дозы и не позднее чем за 4 недели до начала яйцекладки.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать

Период выведения: Не применять за 3 недели до убоя и за 4 недели до начала периода яйцекладки.

Форма выпуска: 250 мл (500 доз), 500 мл(1000 доз).

01032023

bioveta

WE respect ANIMALS

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ



Производитель:
Bioveta, a. s. (АО «Биовета»)
ул. Коменского 212/12
683 23 Ивановице-на-Хане
Чешская Республика

тел. +420 517 318 888
e-mail: info@bioveta.cz
www.bioveta.cz

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к консультантам:

Д-р Вухиб Ауэле, д.в.н.
(Wuhib AYELE, DVM, PhD)
тел: +420 775 894 441
e-mail: ayele.wuhib@bioveta.cz